



**MAIA**  
Yvelines Grand Sud



## FICHES D'INTERVENTION À DOMICILE



Ces fiches constituent un des outils du **KIT PRÉVENTION** mis en place dans le cadre des visites à domicile réalisées par les professionnels



# CAFARDS



## INDICE D'INFESTATION

- Vérifier la nuit en allumant la lumière leur présence dans leur habitat favori, cuisine, salle de bain (endroits humides, sombres et chauds)
- Ils ne sont pas uniquement dans les lieux sales

## PRÉVENTION

- Utiliser des « surchaussures »
- Allumer la lumière
- Ne pas poser son sac et manteau au sol ou sur les meubles
- **L'aromathérapie**  
Eucalyptus citronné / Lavande

## RISQUES

- Eczéma, Allergies et Asthme liés aux excréments, mues et traces de salives
- Situation de stress lié à leur présence

## LUTTE / CURATIF

- Vider les poubelles et les laisser fermées
- Conserver les produits alimentaires dans des boîtes fermées
- Garder la cuisine propre, utiliser un désinfectant pour les appareils électroménagers
- Ne pas les écraser, les jeter dans les toilettes et tirer la chasse d'eau (pour éviter l'éclosion des œufs)
- Aspirer le nid, nettoyer à la vapeur, utiliser des pièges à cafards

# PUNAISES DE LIT



## INDICE D'INFESTATION

- Vous avez des piqûres, dont des nouvelles chaque matin
- Vous avez des démangeaisons
- A la lumière du jour, des traces de déjections noires sur le matelas, sommier, rideaux, plinthes, ou de sang sur les draps

## PRÉVENTION

- Éviter le contact avec les objets infestés
- Ne pas poser d'affaires au sol ou sur les meubles (sac à main, manteau...)
- Porter des vêtements pouvant être lavé à 60°, des sur chaussures, gants, puis les mettre dans des sacs poubelles fermés à l'issue de la visite
- Allumer la lumière
- **L'aromathérapie**  
Pyrèthre

## RISQUES

- Stress, angoisse, Insomnie
- Terreurs nocturnes
- Autres troubles psychologiques
- Anémie
- Lésions cutanées avec réaction inflammatoire
- Parfois manifestations allergiques type urticaire

## LUTTE / CURATIF

- Calfeutrer toutes les plinthes, fissures, gaines électriques
- Coller de l'adhésif double face autour du cadre de lit et sur leur chemin
- Laver tous les textiles à 60°, mettre les plus fragiles dans un sac au congélateur à -20 degré pendant 72h
- Nettoyage à l'aspirateur et jeter le sac dans un sac poubelle fermé hermétiquement

# RONGEURS



INDICE D'INFESTATION	PRÉVENTION	RISQUES	LUTTE / CURATIF
<ul style="list-style-type: none"><li>• Présence de déjections dans les recoins sombres (derrière le réfrigérateur, sous les radiateurs, rideaux)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hygiène, désinfections et protections des plaies</li><li>• Informer les salariés, partenaires se rendant sur place</li><li>• Vaccination sur recommandation du médecin du travail (Leptospirose)</li><li>• Ne pas manger ou fumer sur les lieux à risques.</li><li>• <b>L'aromathérapie</b> Laurier noble / Sauge Sclarée / Menthe Poivrée</li></ul>	<p><b>En cas de morsure ou griffure</b> Il convient de se laver les mains et de surveiller le risque d'infection</p> <p>Si de la fièvre apparaît, il faudra consulter son médecin pour un traitement antibiotique</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Leptospirose, fièvre d'Haverhill (Maladie du rat)</li><li>• Salmonellose</li><li>• la tularémie, la méningite, les ténias, la jaunisse infectieuse, la peste bubonique, des hanta virus</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il est important de désinfecter toute surface qui aurait pu être contaminée</li><li>• Les solutions domestiques sont souvent insuffisantes. Il faut faire appel à un professionnel</li></ul>

# PIGEONS



## INDICE D'INFESTATION

- Présence et accumulation de fientes
- Roucoulement

## PRÉVENTION

- Ne pas toucher les fientes
- Ne pas inhaler
- **L'aromathérapie** Eucalyptus

## RISQUES

- La salmonellose : Maladie infectieuse provoquée par la bactérie Salmonella, provoquant des gastro-entérites
- L'ornithose : Maladie infectieuse due aux bactéries chlamydia psittaci. Elle se manifeste par une inflammation du poumon
- Pneumonie, état grippal
- Diarrhée, fièvre

## LUTTE / CURATIF

- Utilisation de produits répulsifs
- Faire appel à des entreprises spécialisées
- Décontaminer des surfaces à l'aide d'une solution d'eau de javel à 1% pendant 30min puis rincer à l'eau

# CHIENS ET CHATS



INDICE D'INFESTATION	PRÉVENTION		RISQUES	LUTTE / CURATIF
	CHIENS	CHATS		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Présence des animaux et de leurs excréments</li></ul>	<b>Observation du comportement</b> (saute contre une porte ou clôture, se promène de long en large, grogne, montre les dents)	<b>Observation du comportement</b> (poils hérissés, oreilles tendues)	<b>Morsure/griffure</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Infection locale</li><li>• Douleur</li><li>• Rage</li><li>• Tétanos</li><li>• Pasteurellose</li></ul>	<b>En cas de plaie</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nettoyage de la plaie à l'eau et eau savon</li><li>• Antiseptique</li><li>• Pansement stérile</li><li>• Vérifier votre calendrier vaccinal (Tétanos) + vaccin rage de l'animal</li></ul>
	<b>L'aromathérapie</b> Lavande / Écorce d'orange / Citron / Citronnelle			<b>Zoonose</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vers intestinaux,</li><li>• Toxoplasmose (attention femmes enceintes)</li><li>• Infections cutanée (teigne et gale)</li></ul> <p>&gt;&gt; Consulter son médecin traitant</p>

# GALE



## INDICE D'INFESTATION

- Le parasite responsable de la gale mesure environ 0,4 mm de long
- La gale se traduit par :  
Éruption papuleuse /  
Nodules / Vésicules /  
Pustules / Croûtes /  
Lésions de grattage
- Elle est présente principalement sur les mains (espaces interdigitaux), sur le pli cutané du poignet, du coude ou du genou, sur les fesses, dans la région inguinale

## PRÉVENTION

- Il n'existe pas de réels moyens de prévention contre la gale
- Il est recommandé d'éviter le contact direct avec une personne infestée
- **L'aromathérapie**  
Eucalyptus / Bois de cèdre / Citron / Menthe / Arbre à thé / Palmarosa / Lavande

## RISQUES

### Surinfection des lésions de grattage

- Fièvre
- Plaies purulentes

### Consulter son médecin traitant

>> Si persistance des symptômes plus de 15 jours après la fin du traitement, cela signifie que le parasite est toujours présent

## LUTTE / CURATIF

- Application d'antiparasitaires locaux

**Pour les adultes**  
mélanger des huiles essentielles :

3 gouttes d'**ajowan**  
+ 1 goutte de **clou de girofle**  
+ 2 gouttes de **tea tree**  
+ 2 gouttes de **thym à cinéol**

En application, 3 gouttes, deux fois par jour, pendant trois semaines

# POUX DE TÊTE



INDICE D'INFESTATION	PRÉVENTION	RISQUES	LUTTE / CURATIF
<ul style="list-style-type: none"><li>• Présence d'insectes (poux) ou lentes sur les cheveux de la personne (contrairement aux pellicules, les lentes s'accrochent aux cheveux)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eviter tout contact rapproché avec la personne infestée</li><li>• Eviter tout contact avec les vêtements et objets de la personne infestée</li><li>• Attacher les cheveux longs pour réduire le risque de contamination</li><li>• <b>L'aromathérapie</b> Lavande / Arbre à thé / Palmarosa / Niaouli / Geranium Rosat</li></ul>	<p><b>Symptômes</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fortes démangeaisons</li><li>• Sensation de chatouillement dans les cheveux</li><li>• Petites bosses rouges sur le cuir chevelu</li></ul>	<p><b>Préconisations</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Utiliser des produits spéciaux anti-poux</li><li>• Lavez le linge au moins à plus de 60°C</li><li>• Pour les objets ne pouvant être lavés, les enfermer dans un sac plastique hermétique pendant 48h minimum</li><li>• Passer régulièrement l'aspirateur dans le logement</li></ul>

# TIQUES



INDICE D'INFESTATION	PRÉVENTION	RISQUES	LUTTE / CURATIF
<ul style="list-style-type: none"><li>• Petite rougeur avec une pointe noire au milieu</li><li>• Cet acarien aime se loger dans les zones humides et protégées du corps telles que les aisselles, l'aîne, le nombril, les conduits auditifs, les plis des genoux, le cuir chevelu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Porter des vêtements longs qui couvrent les bras et les jambes et serrent les poignets et chevilles (de préférence de couleur claire)</li><li>• Porter des chaussures fermées</li><li>• Appliquer un répulsif cutané sur les parties découvertes (contre-indiqué chez la femme enceinte et les enfants) ou répulsif vestimentaire</li><li>• <b>L'aromathérapie</b> Arbre à thé / Lavande / Clou de girofle / Lemongrass</li></ul>	<p><b>Transmission de la bactérie / risque d'infectio</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Plus une tique infectée reste fixée longtemps sur la peau, plus le risque de transmission de la bactérie augmente</li><li>• Si une plaque rouge et ronde apparaît autour de la morsure dans les deux semaines suivant la morsure, c'est le signe d'une maladie de Lyme débutante</li><li>• Risque de fièvres hémorragiques</li><li>• Risque d'encéphalites</li></ul>	<p><b>Retirer la tique</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Saisissez-la tique à la base et tirez vers le haut, sans tourner (à l'aide d'un tire-tique ou d'une pince à épiler)</li><li>• Une fois retirée, se nettoyer les mains et la zone de morsure avec de l'eau et du savon puis la désinfecter avec un antiseptique ou de l'alcool</li><li>• Possible réaction inflammatoire sans gravité due à la morsure qui survient au bout de deux à quatre jours et qui disparaît spontanément en quelques jours</li></ul>



## DOMICILE INSALUBRE ? INFESTE ? NON ENTRETENU ? PENSEZ À VOUS PROTÉGER



**Quelques astuces recensées pour vous, professionnels, dans le cadre des visites à domicile :** ne pas poser vos affaires au sol (si possible les laisser dans votre véhicule), se protéger avec un masque / sur chaussures / gants si la situation le permet, attacher ses cheveux, isoler les animaux, utiliser du répulsif/des huiles essentielles en préventif et curatif.

### LES OBLIGATIONS LIÉES À LA PROPRIÉTÉ

**Article 32 - section 3 du Règlement sanitaire départemental des Yvelines :** entretien des bâtiments et de leurs abords avec mise en œuvre des mesures préventives et curatives de lutte contre toute infestation.

**Loi n° 89-462 du 06/07/1989 :** Le propriétaire se doit de mettre en location un logement sain. Il sera responsable de l'éradication dans les parties privatives et parties communes (en cas de monopropriété). Il devra effectuer l'opération de désinsectisation et supporter le coût de l'intervention.

### LES OBLIGATIONS LIÉES À LA LOCATION

**Articles 1708 et suivants du code civil :** définissent les obligations générales du locataire (usage, paiement du prix du bail, travaux d'amélioration réalisés par le bailleur, entretien, etc.).

**Décret n° 87-713 du 26/08/1987 :** Le locataire pourra se voir répercuter le coût du produit utilisé en cas d'éradication uniquement lors de la régularisation des charges.

### LES ANIMAUX, VOLATILES, ETC.

**Article 26 - Règlement Sanitaire Départemental des Yvelines :** interdiction d'attirer des animaux (chats, pigeons, etc.) quand cette pratique est une cause d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage.

**Loi du 20/06/08 :** toute morsure d'un chien doit être déclarée à la mairie. Le propriétaire de l'animal devra le présenter à un vétérinaire ; les résultats de la consultation (état de santé de l'animal, évaluation comportementale) seront communiqués à Monsieur le Maire.

**Loi du 17/06/92 :** toute entreprise 3D (dératisation, désinsectisation, désinfection) doit être agréé par la Chambre syndicale des industries.





**EN CAS DE BESOIN, NOUS VOUS INVITONS À CONTACTER  
LE PROFESSIONNEL SUIVANT AU SEIN DE VOTRE STRUCTURE.**



.....

.....

.....

.....